

กอรคลัง	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
เลขที่.....	๗๕๘๓
วันที่.....	- ๒ ก.ย. ๒๕๕๘
เวลา.....	๑๖.๙๑ น.



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
เลขที่..... ๗๐๔๒  
วันที่..... ๕ ก.ย. ๒๕๕๘  
เวลา..... ๑๗.๘๙

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ ด.๔

กระทรวงการคลัง  
ถนนพระราม ๖ กม. ๑๐๔๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม  
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

๖๓๒/ - ๗ ก.ย. ๒๕๕๘

๑๐.๒๖

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ ๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ ๑๑๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางกำกับการใช้ยากลูโคซามีนของราชวิทยาลัยแพทย์อโรมปิดิกส์แห่งประเทศไทย  
๒. ปรับปรุงการใช้ยากลูโคซามีน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้พิจารณากำหนดให้กลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า (กลูโคซามีน คอนดรอยตินชัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไอกลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็นรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

## กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. เนื่องจากศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือที่อ้างถึง ๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศผลแห่งคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าวัสดุพยาบาลมีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรยกหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายากลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า (Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis: SYSADOA) ประกอบด้วย กลูโคซามีน คอนดรอยตินชัลเฟต และไดอะเซอเรน และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไอกลูโรแนนและอนุพันธ์) ดังนี้

๑.๑ การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีน ให้เป็นไปตามแนวทางกำกับการใช้ยาของราชวิทยาลัยแพทย์อโรมปิดิกส์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๒ การเบิกจ่ายค่ายาคอนดรอยตินชัลเฟต ได้ของเชอเรน และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ ไปพลางก่อน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๒. การเบิกจ่ายค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้ดำเนินการผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่าวัสดุพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษาพยาบาล

ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ คือเป็นดังนี้ไป สำหรับกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียาจำหน่าย ให้ถือปฏิบัติตาม  
หนังสือที่อ้างถึง ๕ หรือพระราชบัญญัติเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม<sup>๑</sup>  
แล้วแต่กรณี โดยในการเบิกค่ายากลูโคซามีนประเภทผู้ป่วยนอก ให้แพทย์ผู้ทำการรักษาที่สามารถสั่งใช้ยา  
ตามแนวทางกำกับการใช้ยาของราชวิทยาลัยฯ ออกใบรับรองการใช้ยากลูโคซามีน รายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อให้ผู้มีสิทธินำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากส่วนราชการต้นสังกัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบริส ชัยสุคร)

รองปลัดกระทรวงกลัง

ผู้แทนกิจกรรมด้านระบบสุขภาพ

ปฏิบัติงานการแทน ปลัดกระทรวงกลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

ผู้น ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ภารกิจด้านการบริหารฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่

แนะแนวฯ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ภารกิจด้าน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ภารกิจด้านปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ

ทางการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓/๙/๕๘

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓/๙/๕๘

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๔ กค. ๕๘

## แนวทางกำกับการใช้ยาแก้อстеอไซติซึมของราชวิทยาลัยแพทย์อโรมปิดิกส์แห่งประเทศไทย

๑. ใช้ยาแก้อстеอไซติซึมในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจากความชราเท่านั้น ไม่รวมภาวะหรือโรคข้อเข่าเสื่อมจากการบาดเจ็บ โรคอื่นๆ รวมทั้งโรคติดเชื้อและความพิการแต่กำเนิด โดยมีความมุ่งหมายบรรเทาอาการปวด และการลดการใช้ยาต้านการอักเสบทุกชนิดลงให้ได้ระหว่างการใช้ยาแก้อстеอไซติซึมนี้

๒. ผู้ป่วยต้องมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อนของข้อถูกทำลายบางส่วน แต่ยังไม่หมด โดยพิจารณาจากการตรวจร่างกายและภาพถ่ายรังสีข้อเข่าตามแนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์อโรมปิดิกส์แห่งประเทศไทย

๓. ผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่ตามแนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์อโรมปิดิกส์แห่งประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน แต่อาการปวดไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้านการอักเสบ หรือมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ โดยเฉพาะผู้ป่วยมีการทำงานของไตหรือตับบกพร่อง

๔. การรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมที่กล่าวถึงในข้อ ๓ ได้แก่ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับธรรมชาติของโรคข้อเสื่อมจากความชรา การลดความเสี่ยงที่อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการหรือพยาธิสภาพมากขึ้น การบริหารร่างกาย การควบคุมน้ำหนัก และการใช้เครื่องรัดดัดพยุงรูมทั้งขาใช้เครื่องช่วยเดิน

๕. ผู้ป่วยต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๖ ปีขึ้นไป

๖. การใช้ยาแก้อстеอไซติซึ่งไม่ใช้ร่วมกับยาในกลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่อักเสบช้า (Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis: SYSADOA) ชนิดอื่น

๗. ระหว่างการให้ยาแก้อстеอไซติซึ่งไม่ใช้ยาต้านการอักเสบขนาดโดยอย่างต่อเนื่อง อาจใช้ยาต้านการอักเสบหรือยาควบคุมอาการปวดได้เป็นครั้งคราว และให้ยาต้านการอักเสบช่วงละไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หากต้องใช้ยาต้านการอักเสบท่อเนื่อง ให้ถือว่ายาแก้อстеอไซติซึมนี้ได้ผลในผู้ป่วยนั้น และต้องระงับการใช้ยาขนาดนั้น

๘. ให้ใช้ยาแก้อстеอไซติซึ่งติดต่อกันได้โดยมีข้อจำกัดคือเมื่อผู้ป่วยได้รับยาแล้วต้องมีการประเมินอาการภายใน ๓ เดือน หากอาการของผู้ป่วยไม่ทุเลาหรือกลับต้องการยาต้านการอักเสบและ/หรือยาควบคุมอาการปวดดังเดิม โดยตลอด ให้ถือว่า yan ไม่ได้ผลต้องระงับการใช้ยา หากผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอาจให้ยาขนาดนั้นต่อได้และหยุดการใช้ยานั้นในเดือนที่ ๖ และเฝ้าดูอาการของผู้ป่วยต่อ เป็นการประเมินประสิทธิผลต่อเนื่องของยา เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ เดือน หากผู้ป่วยกลับมีอาการมากขึ้นเหมือนก่อนการใช้ยาแก้อстеอไซติซึ่ง จึงอาจพิจารณากลับใช้ยาแก้อстеอไซติซึ่งได้อีกหลังระยะเวลา ๓ เดือนที่หยุดการใช้ยาไปแล้ว และต้องประเมินผลการใช้ใหม่เมื่อเริ่มต้นใช้ยาแก้อстеอไซติซึ่ง

๙. แพทย์ผู้สามารถสั่งการรักษาให้ยาแก้อстеอไซติซึ่งได้ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรแพทย์โรคข้อ สาขาเวชศาสตร์พื้นพู หรือสาขาอโรมปิดิกส์ เท่านั้น ไม่รวมแพทย์ผู้ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ฝึกหัดที่ทำงานอยู่ในภาควิชา กลุ่มงาน หรือกอง ของสาขาวิชาทั้งสามนี้

๑๐. แพทย์ผู้รักษาต้องบันทึกอาการ อาการแสดง การดำเนินโรคและภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ของผู้ป่วยอย่างชัดเจนทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับการรักษา

๑๑. การสั่งการใช้ยาแต่ละครั้งต้องไม่เกินช่วงละ ๖ สัปดาห์



## ใบรับรองการใช้ยาสูโคชาเมิน

(ประมวลรายละเอียดการรักษาพยาบาลให้ครบถ้วน)

ข้าพเจ้า ..... เลขที่เวชกรรม .....

แพทย์เฉพาะทางสาขา  อายุแพทย์โรคข้อ  เวชศาสตร์พื้นฟู  ออร์โธปิดิกส์

ชื่อสถานพยาบาล .....

ขอรับรองว่า

๑. (ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย) ..... อายุ ..... ปี

เลขประจำตัวประชาชน ..... ควรได้ใช้ยาสูโคชาเมินเนื่องจาก

- ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อนของข้อถูกทำลายบางส่วน แต่ยังไม่หมด
- ผู้ป่วยได้ผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่แล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน แต่ไม่ได้ผล
- ผู้ป่วยมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้านการอักเสบ

๒. ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินอาการผู้ป่วยและสั่งใช้ยาตามแนวทางกำกับการใช้ยาสูโคชาเมินของราชวิทยาลัย

แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/ว ๘๓ ลงวันที่  
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

รายละเอียดการสั่งจ่ายยา

๑. สั่งจ่ายยาเพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นระยะเวลา ..... (ระบุหน่วยนับ เช่น สัปดาห์)

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ .....

๒. รายละเอียดยาที่สั่งจ่าย

๒.๑ รูปแบบ (เช่น เม็ด แคปซูล ผง) .....

๒.๒ ความแรงหรือขนาดบรรจุ ..... (ระบุหน่วยนับ เช่น มิลลิกรัม)

๒.๓ จำนวน ..... (ระบุหน่วยนับ เช่น เม็ด ซอง)

ลงชื่อ .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....